

BESCHREIBUNG

Die WEPA NaCl Inhalationslösung wird zur Befeuchtung der oberen und unteren Atemwege durch Verneblung mit einem elektrisch betriebenen Kompressor- oder Ultraschallvernebler eingesetzt. Beispielsweise als Begleitmaßnahme zur Behandlung von Erkältungskrankheiten (z. B. Schnupfen, Husten etc.), Entzündungen oder chronischen Erkrankungen (z. B. Heuschnupfen, Asthma, COPD etc.). Die WEPA NaCl Inhalationslösung sorgt für eine ausreichende Befeuchtung der Schleimhaut Ihrer Atemwege, wodurch ein unangenehmes Austrocknen verhindert wird. So wird die natürliche Reinigung Ihrer Atemwege unterstützt. Auch bei langen Aufenthalten in klimatisierten oder geheizten Räumen mit geringer Luftfeuchtigkeit oder bei vermehrter Staub- und Schadstoffbelastung (z. B. durch Staub oder Tabakrauch) macht sich ein positiver Effekt bemerkbar. Für die WEPA NaCl Inhalationslösung gibt es keine Altersbeschränkung und kann somit auch bei Kleinkindern angewendet werden.

ANWENDUNG

Je nach Bedarf, bis maximal 4-mal täglich, jeweils den Inhalt einer Ampulle in den Vernebler nach Angaben des Herstellers Ihres elektrisch betriebenen Kompressorverneblers oder Ultraschallverneblers füllen. Die Dauer der Inhalation richtet sich nach der Art und Ausstattung Ihres Inhalationsgerätes und kann daher etwas variieren. Sie sollte für die 5 ml Ampulle der WEPA NaCl Inhalationslösung aber 20 Minuten nicht überschreiten. Ansonsten wenden Sie sich bitte an den Hersteller Ihres Inhalationsgerätes.

VORBEREITUNG DER INHALATION

Öffnen Sie den Vernebler durch leichtes Drehen des Vernebler-Oberteils gegen den Uhrzeigersinn und nehmen Sie dieses vom Medikamentenbecher ab. Öffnen Sie die Ampulle und füllen Sie die WEPA NaCl Inhalationslösung in den Medikamentenbecher des Verneblers. Bei Anwendung von WEPA NaCl Inhalationslösung in Verbindung mit einem Arzneimittel, bitte die Verdünnungsangaben in der Gebrauchsinformation des Arzneimittels befolgen. Halten Sie den Vernebler aufrecht und verschrauben Sie die Teile miteinander.

INHALATION MIT DEM MUNDSTÜCK

Nehmen Sie das Mundstück zwischen die Zähne und umschließen Sie es mit den Lippen. Setzen Sie sich aufrecht und entspannt hin. Atmen Sie ruhig und gleichmäßig über das Mundstück ein und atmen Sie nach wenigen Sekunden durch die Nase aus.

INHALATION MIT DER MASKE

Halten Sie die Maske auf Ihr Gesicht, so dass Mund und Nase dicht umschlossen sind. Führen Sie den Atemvorgang wie oben beschrieben durch.

ZUSAMMENSETZUNG

1 ml enthält: Natriumchlorid (NaCl) 0,9 %, Hilfsstoff: Wasser für Injektionszwecke.

PACKUNGSGRÖSSE

20 Ampullen mit 5 ml isotonischer Kochsalzlösung (NaCl 0,9 %) PZN 16582731

VORSICHTSMASSNAHMEN UND WARNHINWEISE



- Nicht zur Injektion verwenden.
- Nicht verwenden bei beschädigter Ampulle.
- Nicht anwenden bei einer bestehenden Überempfindlichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe.
- Nur zur einmaligen Anwendung bestimmt; da die WEPA NaCl Inhalationslösung keine Konservierungsmittel enthält, dürfen Reste der Lösung nicht mehr verwendet werden.
- Verwenden Sie die Lösung nicht nach Ablauf des Verfalldatums. Dieses finden Sie auf jeder Ampulle sowie auf der Faltschachtel eingepägt.
- Die WEPA NaCl Inhalationslösung befindet sich in kleinen Kunststoffbehältern, die von kleinen Kindern verschluckt werden könnten. Bitte bewahren Sie deshalb die WEPA NaCl Inhalationslösung unzugänglich für Kinder auf.
- **Die WEPA NaCl Inhalationslösung kann auch zur Verdünnung von Arzneimitteln bei der Inhalation verwendet werden. Vor dieser Anwendung muss die Gebrauchsinformation des Arzneimittels sorgfältig gelesen und befolgt werden. Das Arzneimittel muss für diese Darreichungsform vorgesehen sein. Bitte befolgen Sie die Anweisungen Ihres Arztes oder Apothekers.**











MELDUNG VON NEBENWIRKUNGEN:

Informieren Sie bitte den Hersteller und die zuständige Behörde für Medizinprodukte, sollten schwerwiegende Nebenwirkungen mit dem Produkt auftreten.

LAGERUNG

Bei 2 °C bis 25 °C lagern. Vor Frost schützen.
Bitte lagern Sie die Ampullen immer in der Faltschachtel.

 Chargen-Nummer und  „verwendbar bis“ sind auf der Faltschachtel eingepägt.

 STERILE A	Aseptische Herstellung		Nur zum Einmalgebrauch
	Beschreibung und Art der Anwendung entnehmen Sie dieser Gebrauchsanweisung		Lagerungstemperatur
	Bei beschädigter Ampulle nicht verwenden		Vor Nässe schützen
	Vor Lichteinstrahlungen schützen		Nicht zur Injektion verwenden
	SFS582731		



DIE APOTHEKENMARKE

Vertrieb durch:
WEPA Apothekenbedarf
GmbH & Co KG
D-56204 Hillscheid
T +49 (0)2624 107-361
www.wepa-dieapothekenmarke.de



Hersteller:
EUROSIREL S.p.A.
Viale Europa, 30
20047 Cusago (MI) Italy

Stand der
Information: 02/2021

